

VisCheck

ビズチェック

SARS-CoV-2 抗原検査キット

唾液用

ご使用方法

Ver.2.0



本品は研究用試薬であり、薬機法に基づく体外診断用医薬品の承認は受けておりません。

キットの内容

① A チューブ (フタ付き綿棒入り)



② B チューブ (フタ入り)




③ 検査カセット (アルミパッケージに入っています)




結果判定

判定例を模式的に表したものであり、実際の見え方とは異なります。


陽性 2本ともラインが見えている場合



実際の例





陰性 Cの下に1本のラインが見えている場合



※ 15分以上経過した場合、2本のラインが見ることがありますが、判定には使用しないでください。


無効 Cの下にラインが見えていない場合



手順書

1. 唾液をとる

綿棒のスポンジ部分が完全に柔らかくなるまで、軽く噛むようにして唾液を含ませる。(3分)



2. Aチューブ開封

Aチューブのシールを取り外す。
※液をこぼさないように注意してください。



3. 綿棒を挿入する

唾液を含んだ綿棒を、フタがしまるまでしっかりとチューブに挿入する。




4. Bチューブ開封

Bチューブのシールを取り外す。
※液をこぼさないように注意してください。



6. フタをしめる

Bチューブにフタをしっかりと装着する。



7. 液を混ぜる

Bチューブの中の液をしっかりと混ぜるために、チューブの下の方を10回揉む。

※Bチューブ下部はやわらかく、もみやすくなっています。



8. カセットに滴下する

検査カセットを平らな場所に置き、手順7の液を4滴、滴下窓に1滴ずつゆっくりぽたぽたと滴下する。



5. 試薬に唾液を入れる

手順3のAチューブから手順4のBチューブの中に液を1滴、垂直に滴下する。



9. 判定結果を待つ

15分後に判定を行います。ただし、15分より前でも2本ともラインが見えている場合、「陽性」と判定できません。

※15分以上経過した場合、2本のラインが見えることがありますが、判定には使用しないでください。

